

VACUNACION

El programa de vacunación en El Instituto Municipal de Pensiones está dirigido a todos los derechohabientes afiliados, y a población abierta, de lunes a viernes de 8:30 a 13.30 Hrs y de 14.00 a 19:00 horas. Y se aplican según existencia de biológico y conforme a los lineamientos del Manual de Vacunación 2022 vigente.

Las vacunas que se aplican son las que están dentro del Esquema que maneja la secretaria de Salud, y que se encuentran especificadas dentro de las Cartillas Nacionales de Salud según grupo etario. Estas cartillas son, para los niños de 0-9 años, adolescentes de 10 a 19 años, mujeres adultas de 20 a 59 años, hombres adultos de 20 a 59 años, y la cartilla para todos los adultos mayores de 60 años.

Todas las acciones realizadas en el proceso de vacunación son registradas en la Cartilla Nacional de Salud.

En esta temporada invernal a partir del 13 de octubre del 2025, te invitamos especialmente a que te vacunes contra la Influenza, que protege contra una enfermedad que es potencialmente mortal, sobre todo proteger a los niños menores de 5 años, pacientes con enfermedades pulmonares y crónicas como la diabetes, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personal de salud.

La vacuna es segura, son virus muertos que le ayudan a nuestro organismo a crear defensas para protegernos contra la influenza. Hay que aplicarla en cada temporada invernal.



VACUNACION 2025	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
BCG (TUBERCULOSIS)	14	20	20	0	13	19	0	0	0	86
ANTIHEPATITIS B	23	24	15	22	0	33	23	46	24	210
HEXAVALENTE	61	55	74	104	84	57	64	61	72	632
DPT(DIFTERIA, TOS FERINA, TET)	15	11	39	39	143	19	11	25	0	302
ROTAVIRUS (DIARREAS ROTAVIRUS)	26	31	26	29	34	24	32	29	35	266
NEUMOCOCO niño	30	42	63	70	60	40	46	48	62	461
TRIPLE VIRAL (SRP)Sarampion,Rubeola,Parotiditis	57	47	187	342	314	66	43	131	199	1386
VPH	2	10	1	28	67	25	10	0	42	185
SABIN (POLIOMELITIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SR (Sarampion, Parotiditis)	0	0	80	40	30	90	340	394	0	974
TD (DIFTERIA TETANOS)TDPa	36	53	26	140	148	26	45	50	17	541
ANTINEUMOCOCICA ADULTO	4	1	2	0	5	2	0	0	0	14
HEPATITIS B ADULTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFLUENZA TOTAL NIÑOS Y ADULTOS	179	90	135	30	0	0	0	0	0	434
TOTAL	447	384	668	844	898	401	614	784	451	5491

Biológicos aplicados en el Instituto Municipal de Pensiones 2025.

Fuente Censo Nominal de aplicación de vacunas.



ESQUEMA DE VACUNACIÓN						ESQUEMA DE VACUNACIÓN																													
Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis	Edad de vacunación oportuna	Fecha de aplicación	Lote de la vacuna	Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis	Edad de vacunación oportuna	Fecha de aplicación	Lote de la vacuna																								
BCC	Tuberculosis meningea y miliar	Única	Al nacer			Influenza	Neumonía por virus de la influenza A y B	Primera	A partir de los 6 meses																										
Hepatitis B	Hepatitis B	Única	Al nacer					Segunda	Al mes de la primera																										
Hexavalente DPaT+VPI+ Hib+HepB	Difteria, Toseferina, Tetanos, Poliomielitis, Hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenzae tipo b, como neumonía y meningitis	Primera	2 meses			SRP (Triple viral)	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	Una dosis cada temporada invernal	1 año																										
		Segunda	4 meses						2 años																										
		Tercera	6 meses						3 años																										
		Cuarta	18 meses						4 años																										
DPT	Difteria, Toseferina y Tetanos	Refuerzo	4 años			Primera	12 meses																												
Rotavirus	Diarrea por Rotavirus	Primera	2 meses			Segunda*	A partir de los 18 meses																												
		Segunda	4 meses																																
Neumocócica conjugada	Neumonía, meningitis y otras enfermedades graves causadas por neumococo	Primera	2 meses			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Otras vacunas</th> <th>Nombre de la vacuna</th> <th>Número de la dosis</th> <th>Fecha de aplicación</th> <th>Lote de la vacuna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Espacio reservado para vacunas no incluidas en el esquema básico del programa de vacunación universal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Otras vacunas	Nombre de la vacuna	Número de la dosis	Fecha de aplicación	Lote de la vacuna	Espacio reservado para vacunas no incluidas en el esquema básico del programa de vacunación universal																			
		Otras vacunas	Nombre de la vacuna	Número de la dosis	Fecha de aplicación						Lote de la vacuna																								
		Espacio reservado para vacunas no incluidas en el esquema básico del programa de vacunación universal																																	
Segunda	4 meses																																		
Refuerzo	12 meses																																		

*Nacidos antes de junio del año 2020 se les aplicará la vacuna SRP a los 6 años.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN 2025

PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL PARA MENORES DE 9 AÑOS

ESQUEMA DE VACUNACIÓN						ESQUEMA DE VACUNACIÓN																								
Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis	Edad de vacunación oportuna	Fecha de aplicación	Lote de la vacuna	Vacuna	Enfermedades que previene	Dosis	Edad de vacunación oportuna	Fecha de aplicación	Lote de la vacuna																			
BCC	Tuberculosis meningea y miliar	Única	Al nacer			Influenza	Neumonía por virus de la influenza A y B	Primera	A partir de los 6 meses																					
Hepatitis B	Hepatitis B	Única	Al nacer					Segunda	Al mes de la primera																					
Hexavalente DPaT+VPI+ Hib+HepB	Difteria, Toseferina, Tetanos, Poliomielitis, Hepatitis B y enfermedades graves por Haemophilus influenzae tipo b, como neumonía y meningitis	Primera	2 meses			SRP (Triple Viral)	Sarampión, Rubéola y Parotiditis	Una dosis cada temporada invernal	1 año																					
		Segunda	4 meses						2 años																					
		Tercera	6 meses						3 años																					
		Cuarta	18 meses						4 años																					
DPT	Difteria, Toseferina y Tetanos	Refuerzo	4 años			Primera	12 meses																							
Rotavirus	Diarrea por Rotavirus	Primera	2 meses			Segunda*	A partir de los 18 meses																							
		Segunda	4 meses																											
Neumocócica conjugada	Neumonía, meningitis y otras enfermedades graves causadas por neumococo	Primera	2 meses			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Otras vacunas</th> <th>Nombre de la vacuna</th> <th>Número de la dosis</th> <th>Fecha de aplicación</th> <th>Lote de la vacuna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Espacio reservado para vacunas no incluidas en el esquema básico del programa de vacunación universal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Otras vacunas	Nombre de la vacuna	Número de la dosis	Fecha de aplicación	Lote de la vacuna	Espacio reservado para vacunas no incluidas en el esquema básico del programa de vacunación universal														
		Otras vacunas	Nombre de la vacuna	Número de la dosis	Fecha de aplicación						Lote de la vacuna																			
		Espacio reservado para vacunas no incluidas en el esquema básico del programa de vacunación universal																												
Segunda	4 meses																													
Refuerzo	12 meses																													

Revisa la cartilla de vacunación de las y los más pequeños de casa, verifica que según su edad, completen su esquema de vacunación.

SRP (Triple Viral)	Primera	12 meses
	Segunda	A partir de los 18 meses

#PrevenIMPE

Previene los contagios de enfermedades prevenibles como Sarampión, Rubéola y Parotiditis)



SARAMPIÓN

Es un **virus** que afecta a personas de cualquier edad, sin embargo, **es más peligrosa en niñas y niños.**

Si presentas fiebre y erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo (ronchas en la piel) y uno o más de los siguientes síntomas:

- Tos seca
- Secreción nasal y ojos rojos y llorosos
- Conjuntivitis
- Ganglios inflamados a nivel del cuello y detrás de las orejas

Acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana para recibir atención médica.

**El médico especificará el tratamiento correspondiente.
No te automediques.**



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE SALUD

MediChihuahua 

SARAMPIÓN

Es un **virus** que afecta a personas de cualquier edad, sin embargo, **es más peligrosa en niñas y niños.**

¡ROMPE LA CADENA!

¿COMO PREVENIR EL SARAMPIÓN?

APLICANDO LA VACUNA A:

NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 6 AÑOS

¿QUÉ MEDIDAS DE HIGIENE NOS PROTEGEN?

- **Lava tus manos** frecuentemente.
- Al toser y estornudar, **cubre nariz y boca** con el ángulo **interno del codo**.
- **Desinfecta las superficies**.
- Mantén la **ventilación de los espacios**.



MÁS CHIHUAHUA
más de lo bueno
GOBIERNO DEL ESTADO



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados



IMPE
Instituto Municipal
de Pensiones



Vacuna SR

- 1ª y 2ª dosis a adolescentes rezagados de 10 a 19 años.

Vacuna Hexavalente

- 1ª, 2ª y 3ª dosis a menores de 1 año.
- 4ª dosis a NN de 1 año.
- Cualquier dosis faltante a NN rezagados de 1 a 4 años.

Vacuna SRP (triple viral sarampión, rubeola, parotiditis)

- Primera dosis a NN de 1 año.
- 2da dosis a NN de 18 meses y 6 años.
- 1ª y 2ª dosis a NN rezagados de 1 a 9 años.

Vacuna SR (doble viral sarampión, rubeola)

- 1ª y 2ª dosis a adolescentes rezagados de 10 a 19 años.

Cualquier dosis faltante de vacunas del PVU en menores de 1 año y hasta 5 años.



Vacuna Abdala y Sputnik contra COVID-19.

Vacuna VPH

La vacuna VPH (Virus del Papiloma Humano), se incorpora como población objetivo a los niños y niñas de 5to. De primaria y de 11 años no escolarizados para vacunarse.

También se incluye a las personas de 11 a 49 años que viven con VIH.

Vacuna a tus niñas de 10 a 14 años contra el virus del VPH que es un factor de riesgo para que las mujeres tengan cáncer del cuello de la matriz, que son junto con el cáncer de mama, los cánceres más frecuentes de la mujer, y que cada año causan más muertes.

Temporada Invernal 2025

La vacuna contra influenza inicia oficialmente su aplicación a partir del 13 de octubre 2025 hasta marzo 2026, entre más pronto te la apliques, mayor protección tendrás durante la temporada invernal.

La aplicación es a partir de los 6 meses de edad, a los menores de 5 años que nunca hayan recibido vacuna, se aplican dos dosis, a adultos a partir de 20 años con factores de riesgo una dosis, a todos los mayores de 60 años una dosis.








**Vacuna
Hexavalente**



La vacuna hexavalente consta de tres dosis, que se aplican a las niñas y niños de 2, 4 y 6 meses de edad, y una dosis de refuerzo a los 18 meses de edad



¡La polio no tiene cura, pero es prevenible con la vacuna hexavalente!





POLIO

-  En México, el **último caso de polio** se registró en 1990
-  Afecta principalmente a **menores de 5 años**
-  Se transmite por **vía fecal-oral** y en algunos otros casos, por **agua o alimentos contaminados**
-  Se previene con la **vacuna hexavalente**

 GOBIERNO DE MÉXICO | SALUD

 gob.mx



DETECCION OPORTUNA DE CANCER CERVICOUTERINO Y CANCER DE MAMA.

Las neoplasias de cáncer de cuello uterino y mama ocasionan en conjunto el 25.3% de las defunciones en mujeres a partir de los 25 años de edad, siendo el cáncer de mama el de mayor incidencia y mortalidad en nuestro país, situación que se repite en el estado de Chihuahua.

OBJETIVO.

Disminuir la mortalidad por cáncer cervicouterino y de mama, a través de tamizaje a las mujeres derechohabientes del IMPE, con la realización de detección de lesiones precursoras de neoplasias (cáncer) y exploración clínica mamaria, ofertando un tratamiento oportuno y de calidad

DETECCION OPORTUNA DE CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO 2025	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	TOTAL
CITOLOGIAS CERVICOVAGINALES	66	86	83	99	99	101	97	90	87	808
EXPLORACION CLINICA DE MAMA	66	86	83	99	99	101	97	90	87	808
TOTAL	132	172	166	198	198	202	194	180	174	1616

Citologías cervicovaginales realizadas 2025

Fuente: bitácora de registro de citologías realizadas.



El programa de detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario está dirigido solo para las mujeres derechohabientes afiliadas al Instituto Municipal de Pensiones. Con horarios de atención de lunes a viernes durante todo el año.

HORARIO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
MATUTINO	9:00 a 13:00 Hrs.	9:00 a 13:00Hrs.	NO HAY TOMA	11:00 a13:00Hrs.	9:00 a 13:00 Hrs
VESPERTINO	17:00 a 19:00 Hrs	15:00 a19:00 Hrs	17:00 a 19:00 Hrs	17:00 a 19:00Hrs	15:00 a 19:00Hrs

En los horarios en que no hay tomas de Papanicolaou, se realiza atención de consulta Ginecológica.

Requisitos para toma de Papanicolaou

- HIGIENE PERSONAL
- ACUDIR 7 DÍAS DESPUES DE HABER TERMINADO TU PERIODO MENSTRUAL
- NO HABER APLICADO OVULOS NI DUCHAS VAGINALES
- 2 DIAS PREVIOS SIN RELACIONES SEXUALES



CÁNCER DE MAMA

¿Qué es?
Es un tumor maligno que se desarrolla en la glándula mamaria, se caracteriza por el crecimiento descontrolado de células malignas, con la posibilidad de diseminarse a otros sitios del organismo

Síntomas:

- Cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama.
- Secreción del pezón que se produce de forma repentina, contiene sangre o se produce solo en una mama.
- Cambios físicos, como pezón invertido hacia dentro o una llaga en la zona del pezón.
- Irritación de la piel o cambios en esta, como rugosidades, hoyuelos, escamosidad o pliegues nuevos.
- Mamas tóxicas, enrojecidas e hinchadas, con o sin erupción cutánea con rugosidad que se asemeja a la piel de una naranja, llamada "piel de naranja".
- Dolor en la mama; particularmente, dolor en la mama que no desaparece. El dolor generalmente no es un síntoma de cáncer de mama, pero debe comunicarse al médico.

EXPLORATE

1. Con los brazos abajo frente a un espejo, fíjate si alguna de tus mamas está deformada, si hay cambio de color o si el pezón está desviado o hundido.

2. Coloca las manos en las caderas, presiona firmemente, inclínate un poco hacia adelante y busca alguno de los cambios mencionados.

3. Ahora observa los cambios, pero con los brazos extendidos hacia arriba.

4. De pie, con una mano detrás de la cabeza, explora empezando por la axila hasta terminar en el pezón.

5. Efectúa todos los movimientos anteriores pero ahora acostada y con una almohada bajo tu espalda.

6. Termina tu exploración apretando el pezón y observa si hay salida de líquido anormal.

CÓMO PREVENIRLO

- MAMOGRAFÍAS CADA 2 AÑOS**
si tienes entre 50-69 años PERMITE DETECTAR EL 90% DE LOS TUMORES
<50 años si tienes antecedentes familiares
- HAZTE UN AUTOEXAMEN DE LAS MAMAS CADA MES DESPUÉS DE LA MENSTRUACIÓN**
- COME SANO**
- HAZ EJERCICIO FÍSICO DE FORMA REGULAR**
- 15' 365 D. TOMA EL SOL 15 MIN AL DÍA TODO EL AÑO (EN VERANO CON PROTECCIÓN)**
LOS BAJOS NIVELES DE VITAMINA D SE ASOCIAN AL CÁNCER DE MAMA
- REDUCE EL CONSUMO DE ALCOHOL AL MÍNIMO**
- NO FUMES**
- EVITA EL SOBREPESO, SOBRE TODO EN LA MENOPAUSIA**

SI TIENES ALGUNA DUDA.

LLAMA AL 072 Y MARCA LAS SIGUIENTES EXTENSIONES.

VACUNAS 6273

DETECCION OPORTUNA DE CANCER 6226

